

# Cortinarius subgênero Telamonia

Chaves de Moser para determinação visual de pequenos grupos

## 1ª parte: véu

- Vermelho-cinábrio.** ..... 3.11.7.6.1
- subgrupos { Formando zonas como cintas  
Cobrindo o pé ± extensamente a partir da base
- Vermelho pardacento ou castanho-avermelhado.** ..... 3.11.7.6.2
- subgrupos { Ápice do pé c/ tons liláceos, violáceos ou rosados  
Ápice do pé sem estas características
- Cinzeno ou castanho-acinzentado, tipos grandes e robustos.** ..... 3.11.7.6.3
- subgrupos { Cutícula com ténue reflexo oliváceo, esporos pequenos: *Leproclybe*  
Cutícula sem tons oliváceos, esporos maiores: *Bovini*
- Ocre, amarelo ou castanho** (se castanho-amarelado e com bétulas cf. 3.11.7.6.1), **tipos mais pequenos**
- Pouco desenvolvido, difícil de observar
- Se visível (pelo menos seco e na margem do chapéu ou no pé), com tonalidades amareladas ou esverdeadas (*Viripedes*: *Leproclybe* + 2 espécies). ..... 3.11.7.6.6
- Ocráceo muito aderente, pé concolor, cutícula ocrácea (húmida também castanho-avermelhada) (*Laeti*: 4 espécies). ..... 3.11.7.6.17
- Bem desenv., cores do esporóforo não-ocráceas eventualmente esverdeadas ou oliváceo-amareladas
- Cutícula ± fibroso-floculada ou c/ escamas (*Helvelloidei*). ..... 3.11.7.6.4
- subgrupos { Só com amieiros, véu amarelo ou cast.-amarelado, lâm. Frequentem. c/ tom violáceo ou cinzeno  
Chapéu e/ou pé com escamas ou flocos (pé eventualmente com “bota”) de cor castanho-amarelada, lâminas nunca violáceas ou cinzentas
- Chapéu liso (*Semivestiti*). ..... 3.11.7.6.5
- subgrupos { Restos de véu no pé em forma de “bota”  
Restos de véu no pé em flóculos ou zonas individuais acastanhado-amarelados, associado a salgueiros alpinos anões
- Branco, violáceo ou ausente** (esporóforo nunca de tons oliváceos)..... ver o pé (2ª parte)

## 2ª parte: pé

- Branco, com ou sem véu** (véu pode ficar castanho no esporóforo velho)
- ± rigido e frequentemente radicante, eventualmente cheiro a rabanete (*Duracini*). ..... 3.11.7.6.7
- Sem estas características (3.11.7.6.6)
- Branco, esporóforo carnudo. .... 3.11.7.6.8
- ± branco, esporóforo grande..... 3.11.7.6.9
- Branco, < 6 mm diâmetro, com ou sem véu, esporóforo pequeno..... 3.11.7.6.10
- Tom azulado, lilás ou violáceo pelo menos no ápice quando jovem** (eventualmente também lâminas e chapéu)
- Esporóforo carnudo, chapéu ≥ 5 cm e pé ≥ 6-8 mm diâmetro. .... 3.11.7.6.11
- subgrupos { Cheiro a rabanete após corte, lâminas ± espessas e distantes, base do pé ± atenuada  
Sem cheiro a rabanete
- Esporóforo mais pequeno e higrófono (*Pulchelli*). ..... 3.11.7.6.12
- Completamente ocre a castanho (cor de base), com ou sem véu branco**
- Esporóforo médio a grande, carnudo
- Chapéu (e pé eventualmente) ocráceo a castanho-avermelhado. .... 3.11.7.6.13
- subgrupos { Lâminas invulgarmente distanciadas  
Sem essa característica
- Chapéu e pé ± castanho-escuro, umbra a negro-acastanhado. .... 3.11.7.6.14
- subgrupos { Zonas do véu brancas (se velho podem ser castanhas)  
Restos de véu brancos quanto muito na base
- Esporóforo mais pequeno, chapéu < 5 cm, pé fininho
- Restos de véu no pé brancos, às cintas
- Esporóforo c/ castanho-avelã, umbra ou negro-acastanhado..... 3.11.7.6.15
- Esporóforo c/ amarelo-avermelhado, raposa, ou castanho-avermelhado..... 3.11.7.6.16
- Restos de véu no pé ausentes ou apenas ligeiramente fibrosos
- Esporóforo ocre-claro (se húmido: castanho-avermelhado claro), eventualmente ténues restos de véu ocráceos (*Laeti*: 4 espécies). ..... 3.11.7.6.17
- Esporóforo castanho-avermelhado/amarelado, véu concolor ao pé ou ausente. .... 3.11.7.6.18
- Esporóforo castanho-escuro, umbra a negro-acastanhado, véu irreconhecível..... 3.11.7.6.19